


# evolutie van de kiloknaller



*Arctocyon*  
ca. 60 miljoen jaar v. C.

*Diacodexis*  
ca. 48 miljoen jaar v. C.

*Metridiochoerus*  
ca. 34 miljoen jaar v. C.

*Sus scrofa*  
ca. 3.000 jaar v. C.

*Sus domesticus*  
ca. 1950

*Sus 'karbonadissimus'*  
ca. 2000

Na miljoenen jaren ontwikkeling van eerste hoefdier naar wild zwijn was daar het varken: *Sus domesticus*. Een intelligent en zindelijk zoogdier, dat het liefst de hele dag de grond doorwoet op zoek naar eikels en paddenstoelen. Eens per jaar krijgt een moedervarken vier tot zeven biggetjes. Vlak voor de bevalling zondert ze zich af van de groep en bouwt ze een nest van zacht materiaal. Samen met de andere moeders voedt ze haar kleintjes op. Het varken van nu echter, is geen echt varken meer. Door jarenlang doorfokken op steeds grotere aantallen biggen is het 'kiloknallervarken' ontstaan: een gefrustreerd moederdier dat haar kleintjes niet goed kan verzorgen.

Het 'kiloknallervarken' wordt in haar leven zesmaal kunstmatig bevrucht. Per bevruchting krijgt ze gemiddeld twaalf biggetjes. Tijdens de bevruchting, de bevalling, en de kraamperiode staat ze gevangen tussen stalen stangen. Een nest maken is onmogelijk. Na vier weken worden de biggetjes bij haar weggehaald en binnen een half jaar vetgemest voor de slacht. Het moedervarken is inmiddels opnieuw bevrucht. In haar leven brengt ze meer dan zeventig biggen ter wereld. Een gewoon varken kan vijftien jaar oud worden. Een 'kiloknallervarken' gaat na drie en een half jaar naar de slacht. **Laat een varken weer varken zijn. Koop geen kiloknallers.**



Kijk voor diervriendelijke tips op [wakkerdier.nl](http://wakkerdier.nl).  
Help mee: giro 4868 tnv Wakker Dier Amsterdam.